

naše pole®

*tabuľky aplikácie
pesticídov – 2025*

Repa cukrová

REGULÁCIA REPKY A OBILNÍN

BONUS PACK

BALÍK na 20 ha

AGROFERT

20 L

AGROZOL

Tebuconazole 250 g/l



LOVOCHEMIE

20 L

**BOROSAN FORTE
BOROSAN HUMINE**

Bór 150 g/l

- preventívny a kuratívny účinok na hubové choroby
- podporuje odolnosť voči vymrzaniu
- spevňuje rastlinu

cena
15,80
€/ha

BALÍK na 20 ha

AGROFERT

20 L

CCC 745 SL

chlormequat-chloride 750 g/l



LOVOCHEMIE

20 L

MANGAN FORTE

Mangán 150 g/l

- podporuje odnožovanie
- spevňuje stebľa rastlín
- zvyšuje odolnosť voči nepriaznivým podmienkam

- zrýchľuje fotosyntézu
- zvyšuje využiteľnosť dusíka rastlinou

cena
5,80
€/ha



AGROFERT

organizačná zložka Agrochémia

<http://bezpecnepestovanie.scpa.sk>

www.agrofert.sk



AGROFERT a.s. je
zakladajúcim členom SCPA

REPA CUKROVÁ-INSEKTIČIDNA OCHRANA

Prípravok	Účinná látka	Škodcovia vzh. rastlin	Drôtovce	Vošky	Atómária repová	Skoky	Sliznky a slizniaky	Hľsenice, statická ozimnová	Motička kapustová,mora bavičková	Kvetárka repová	Zaradenie podľa účinku na veľk	Ochranná doba	Poznámka
ALPHAMIPRID 20 SP, GAZELLE, MOSPILAN 20 SP	acetamiprid 200 g/l										Vč 3	AT	rýchovec, psota 0,25 kg/ha
ALVISOID, NIRANUT, FLURICO	tefluthrin 15 g/l	12-15 kg/ha									Vč 3	AT	
AXELA	metaldelyd 30 g/kg						7 kg				Vč 3	AT	
BELEM 0,8 MG	cypermethrin 8 g/ kg		12 kg/ha								Vč 3	AT	
CYPERKILL MAX	cypermethrin 500 g/l							50 ml/ha			Vč 2	14	
CITHRIN MAX, CYTHRIN MAX	cypermethrin 500 g/l							50 ml/ha			Vč 2	14	
CIARTEX NEO	metaldelyd 30 g										Vč 3	AT	
CORAGEN 20 SC, VESTICOR	chlorantraniliprole 200 g/kg										Vč 3	28	125 ml/ha proti psota repová
DECIS FORTE , DINASTIA FORTE, DELTA EXPERT	deltamethrin 100 g/l					75 ml/ha					Vč 2	7	
FORCE 20 CS, FANCY, GIBRITRIN	tefluthrin 200 g/l		60 ml/VJ *30ml +21,5 g/ VJ	60 ml/VJ *30ml +21,5 g/VJ	60 ml/VJ *30 ml +21,5 g/VJ	*30 ml +21,5 g/VJ					Vč 3	AT	* (TM)Cruiser 70 WS
GUNNER, BEETLON, VAZTAK PRO	lambda-cyhalothrin 50 g/l					0,15 l		0,15		0,15 l	Vč 3	56	max 2 x
KAISU SORBIE	lambda-cyhalothrin 50 g/l			0,1 -0,15 kg							Vč 3	AT	
KARATE ZEON 5 CS	lambda-cyhalothrin 50 g/l			0,15 l *0,1 l+0,2 kg ** 0,1 l+1 l ***0,1 l +1 l							Vč 3	AT	* (TM)Primar 50 WG

LAMBADA	lambda-cyhalothrin 50 g/l								0,15 l								Vč 3	56	
LEPINOX PLUS	bacillus thuringiensis													10 g/10 l/100 m2			Vč 3	AT	
MARKATE 50	lambda-cyhalothrin 50 g/l								0,15 l								Vč 3	56	max 2 x
MAVRİK	tau-Fluvalinate 240 g/l																Vč 3	14	roztočec chmelový 0,2-0,3 l/ha
METAREX INOV	metaldehyd 40 g										4 -5 kg						Vč.3	AT	
MOVENTO SC	spirotertramet 100 g/l																Vč.3	AT	Roztočec chmelový 0,75 l/ha
NEXIDE	gamma-cyhalothrin 60 g/l								*0,08 l								Vč 3	14	Voška maková

REPA CUKROVÁ - INSEKTICÍDNA OCHRANA

Prípravok	Účinná látka	Škodcovia v zch. rastlin	Drôtovice	Vošky	Atomária repová	Skočky	Slimáky a slizniaky	Húsenice, statice ozimínová	Molička kapustová, mora bavičková	Kvetárka repová	Zaradenie podľa účinku na včely	Ochranná doba	Poznámka
PIRIMOR 50 WG	pirimicarb 500 g.kg ⁻¹			0,2-0,1 l) kg/ha							Vč 3	AT	™Karate Zeon 5CS
RAFAN, RAFAN MAX, SWEEP	cypermethrin 500 g/l							50 ml/ha			Vč 2	14	
RAPID	gamma-cyhalothrin 60 g/l			*0,08 l							Vč 3	14	Voška maková
SUPERSEKT MAX, RWA PROTECTOR MAX	cypermethrin 500 g/l							50 ml/ha			Vč 2	14	
XIREN	metaldehyd 30 g						7 kg				Vč.3	AT	

REPA CUKROVÁ – APLIKÁCIA NESELEKTÍVNYCH HERBICÍDOV

obchodný názov prípravku	účinná látka		dávka ha ⁻¹	Termín aplikácie
	druh	obsah na kg (l)	prípravok	
Cosmic, Dominator, Jetstar, Kapazin, Kaput Harvest, Roundup Biaktiv, Touchdown System 4	glyphosate IPA soľ	360 g	2 l (33-50 %)	aplikácia na prerastené buriny krátkovým rámom - roztok nesmie zasiahnuť rastliny repy
Roundup Biaktiv Plus	glyphosate K soľ	441 g	1,9 l (33-50%)	
Roundup Flex	glyphosate K soľ	480 g	1,4 l (33-50 %)	
Roundup Klasik Pro	glyphosate K soľ	441 g	1,5-2 l (33-50%)	
Roundup Rapid	glyphosate K soľ	450 g	1,5 l (33-50 %)	
Ameqa Barbarian Super 360, Bronco, Clinic TF, Clinic UP, Figaro 360, Gallup Super 360, Glyfogon Super, Kaput Harvest UP, Klean G, Master GLY, Monosate G, Rosate TF	glyphosate IPA soľ	360 g	1,5 l	aplikácia po sejbě repy na vzdialené buriny (výmrv obilnín, jednoročné druhy burín) ale ešte pred vzdialením repy

REPA CUKROVÁ - FUNGICÍDY - FOLIÁRNE APLIKÁCIE

Obchodný názov prípravku	Účinné látky a obsah na l ; kg	paralelné prípravky	dávka na 1 ha	škodlivý organizmus				ochranná doba	škodlivosť pre včely	termín aplikácie	poznámka
				cerkasporitiza repy	múčnatka repová	ramuliňová škvrnitosť repy	hrdz repová				
ALONTY	mefenitruconazole 100 g/l ; fluxaproxad 50g/l		0,7-1,0 l	x	x			28	Vc3	Prípravok aplikujte od celkového zapojenia riadkov (BBCH 39) do štádia, keď už koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 49)	aj repa kŕma; počet aplikácií max. 2x za vegetáciu; interval 14 dní
AMISTAR GOLD, MIRADOR UNI, SIMPLIA GOLD	azoxystrobin 125 g/l difenoconazole 125 g/l		1,0 l	x	x			35	Vc3	BBCH 39 až do termínu najneskôr 35 dní pred plánovaným zberom. A	max. 2x za vegetáciu; interval 21 dní
AMISTAR, SIMPLIA, DORBARIS 250 SC	azoxystrobin 250 g/l	ANISTA; AZOXYSTAR; GOLDEN AZOX 250 SC; STROBILK, STROBIN, MIRADOR, GLOBAZTAR AZT 250 SC, AZOSHY, PRIORI	1,0 l	x	x			35	Vc3	preventívne; od 12 listov do 8 týždňov po zapojení porastu (BBCH 43-49)	max. 2. za sebouajúce aplikácie
BAGANI, JAMOTO	tetraconazole 125 g/l	AZONACOL 280, IX-STAR	0,8 l l	x	x			30	Vc3	preventívne alebo pri prvom výskyt príznaakov od rastovej fázy celkom zapojených riadkov BBCH 40	max. počet aplikácií: 1x za vegetáciu sezónu

BELANTY	metentrifluconazole 75 g/l		0,7 - 1,5 kg	x				14	Vč3	Prípravok aplikujte v rastovej fáze, keď už sú riadky celkom zapojené až po dobu, keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 39-49).	max. 2x za vegetáciu
EMINENT 125 ME	tetraconazole 125 g/l		0,8 l	x	x			30	Vč3	pri prvých príznakoch choroby od BBCH 40 (celkom zapojené riadky)	max. 1x za vegetáciu
FUNDAND 450 SC, MOLLUS 450 SC	azoxystrobin 200 g/l; tebuconazole 125 g/l; difenoconazole 125 g/l		0,6-1,0 l	x				35	Vč3	Aplikujte preventívne alebo okamžite po zaznamenaní prvých príznakov choroby, proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy krmnej, od fázy začiatku zapájania rastlín: 10 % rastlín v riadku zapojených, do fázy keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 39 - 49).	max. 2x za vegetáciu proti biela hniloba
GLOB PROMET, PANORAMA	propiconazole 250 g/l; metconazole 90 g/l		0,5 l					56	Vč3	Pri prvých príznakoch choroby	max. 2x za vegetáciu; interval 21 dní
KUMULUS WG	síra 800 g/kg	SIRA 800 WG- SIRIUS	6,0 kg		x			AT	Vč3	od fázy 70 % rastlín v riadku zapojených do fázy zberovej veľkosti koreňa	max. 4x za vegetáciu; interval 10 - 14 dní; neaplikujte pri intenzívnom snežnom svite a pri vysokých teplotách
KUPRIKOL 50	oxychlorid-Cu 840 g/kg; (Cu 500g/kg)		4-5 kg	x				14	Vč3	pri prvých príznakoch choroby od BBCH 40 (celkom zapojené riadky)	max. 1x za vegetáciu
MAVITA 250 EC, BONECO	difenoconazole 250 g/l		0,4 l	x	x			28	Vč3	od fázy BBCH 39-istý pokrývajú 90 % povrchu pôdy do fázy BBCH 49 - buľva dosahuje zberovú veľkosť	aj repa kŕmna; max. 2x za vegetáciu; interval medzi aplikáciami 10-28 dní
CASINO ROYALE	boscalid 267 g/l; pyraclostrobin 67 g/l		1,5 kg	x				14	Vč3	Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov choroby, od začiatku fázy rastu ružice	max. 2x za vegetáciu
POL-SULPHUR 80 WP	síra 800 g/kg		4-7,5 kg		x			14	prípravok nebol klasifikovaný	preventívne resp. ihneď pri prvých príznakoch choroby	max. 3x za vegetáciu; interval min. 10 dní; neaplikujte pri intenzívnom snežnom svite a pri vysokých teplotách
PROPUSLE	fluopyram 125 g/l; prothioconazole 125 g/l		1,0-1,2 l		x	x		21	Vč3	od začiatku zapájania riadkov do zberovej veľkosti (BBCH 31-49)	max. 2x za vegetáciu; interval 21 dní
SCORE	difenoconazole 250 g/l		0,4 l	x		x		28	Vč3	od zapojenia porastu do zberovej veľkosti koreňa (BBCH 39-49)	aj repa kŕmna; max. 2x za vegetáciu; interval 10-28 dní
SERENADE ASO	Bacillus subtilis, kmeň QST 713		2,0 - 4,0 l	x	x			AT	Vč3	preventívne resp. ihneď pri prvých príznakoch choroby	max. 6x za vegetáciu; interval min. 5 dní;
SIARKOL 80 WG	síra 800 g/kg		4-7,5 kg		x			14	0 - riziko pre včely neposúdené	preventívne resp. ihneď pri prvých príznakoch choroby	max. 3x za vegetáciu; interval min. 10 dní; neaplikujte pri intenzívnom snežnom svite a pri vysokých teplotách
SPYRALE, BETAFIT, MERCURY	difenoconazole 100 g/l Fenpropidin 375 g/l		1,0 l	x	x			28	Vč3	BBCH 31-BBCH 49	max. 2x za vegetáciu; interval 21 dní
TERN	fenpropidín 750 g/l		0,375-0,5 l	x		x		28	Vč3	Ošetrte od rastovej fázy keď listy repy pokrývajú 90% povrchu pôdy (BBCH 39) do rastovej fázy keď repná buľva dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 49).	max. 2x za vegetáciu; interval 21 až 28 dní
THIOVIT JET	síra 800 g/kg		6,0 kg		x			AT	Vč3	preventívne resp. ihneď pri prvých príznakoch choroby	max. 3x za vegetáciu; najneskôr do 31.8.; interval 10 dní; neaplikujte pri intenzívnom snežnom svite a pri vysokých teplotách
POLYVERSUM - biologický prípravok	Pythium oligandrum M1 (oospóry mykoparazitické huby) ≥1x106.g ⁻¹		5 g/1 kg osiva		spála repy			AT	Vč3	suché morenie osiva, obalovanie; eliminácia záľho vychladzenia a padania klíčiacich rastlín	autorizované pre MWP; platí aj pre repu kŕmnu

Zdravý list

Je kľúčom k úspechu

Fungicídna ochrana do cukrovej repy

BAGANI

tetraconazole 125 g/l

BETAFIT

difenoconazole 100 g/l
+ fenpropidin 375 g/l

CUPROMIX

hydroxid meďnatý 300 g/l

SIMPLIA

azoxystrobin 250 g/l

SIMPLIA GOLD

azoxystrobin 125 g/l
+ difenoconazole 125 g/l

REEF

Meď 5,5 % (Cu 80 g/l) + Síra 38 % (640 g/l)

Známa fungicídna účinnosť Cu a S v listovom hnojive

- účinne dodáva Cu a S do rastliny
- zvyšuje využitie N rastlinami počas vegetácie
- zvyšuje odolnosť proti chorobám a škodcom



NOVINKA V PORTFÓLIU